



Bulletin

Surveillance épidémiologique


Semaine 43 (du 19 octobre au 25 octobre 2026)

Date de publication : 30 octobre 2026


ÉDITION GRAND EST

Niveaux d'alerte

Syndromes grippaux



Bronchiolite (moins de 1 an)



■ Pas d'alerte ■ Pré-épidémie ■ Epidémie

Points clés

Bronchiolite chez l'enfant de moins de 1 an - p.5



Les recours aux urgences hospitalières restent modérés et stables ces dernières semaines, à des niveaux proches de ceux observés l'année dernière à la même période. Les données de virologie indiquent peu de circulation de VRS dans la région mais d'autres virus susceptibles d'induire des bronchiolites circulent actuellement, en particulier des rhinovirus/entérovirus.



Syndromes grippaux - p.6

L'ensemble des indicateurs de la grippe restent à leur niveau de base en semaine 43 avec peu de détection de virus grippal d'après les données de virologie.



COVID-19 - p.7

En S43, l'activité pour COVID-19 poursuit son augmentation à l'hôpital, mais reste modérée et demeure à des niveaux inférieurs à ceux enregistrés à la même période les années précédentes.




Gastro-entérites aiguës - p.9

Les indicateurs de gastro-entérites aiguës restent dans les fluctuations habituelles.

Actualités

Mois sans tabac



Le défi du Mois sans tabac (MOST) débute le 1^{er} novembre, il reste donc quelques jours pour s'inscrire ou motiver vos proches et vos patients à s'inscrire sur [le site du Mois sans tabac](#).

Déjà plus de 56 000 personnes sont inscrites en France dont plus de 5 800 en Grand Est : continuer à en parler autour de vous c'est permettre à un maximum de personnes de participer à ce défi collectif.

À la clef, 5 fois plus de chance d'arrêter définitivement de fumer après 30 jours de défi et deux fois plus de chance de ne plus fumer dans un an pour les participants.

Le site MOST vous permet de retrouver tous les outils et les informations : 3989, application mobile, site tabac info service, groupe Facebook, kit d'arrêt, liste des événements en proximité.

Et pour les informations régionales, rendez-vous sur le [site de l'ARS Grand Est](#) et du [Mois sans tabac Grand Est](#).

Enfin, si vous souhaitez devenir partenaire, [un site vous est dédié](#) pour commander ou télécharger des outils.



Prévention

Gestes barrière



**Toux ? Fièvre ? Nez qui coule ?
Mettons un masque.**

**Retrouvons le réflexe
des gestes barrières.**



**Porter
un masque**

+



**Se laver
les mains**

+



**Aérer
les pièces**



Recommandations vaccinales

Bronchiolite

Pour la protection des nouveau-nés, la prévention de l'infection par le virus respiratoire syncytial (VRS) s'appuie sur deux stratégies alternatives :

- la vaccination des femmes enceintes entre la 32ème et la 36ème semaines d'aménorrhées (si cette période est située entre septembre et janvier) ;
- l'administration d'anticorps monoclonaux anti-VRS des nouveaux nés eux-mêmes.

La vaccination contre le VRS est également recommandée chez les personnes âgées de 65 ans et plus présentant des pathologies respiratoires et toutes les personnes de 75 ans et plus.

Syndromes grippaux

Chaque année, la vaccination est recommandée aux personnes âgées de 65 ans et plus, aux personnes présentant des maladies chroniques, aux femmes enceintes, aux personnes obèses, et à certains professionnels, dont les professionnels de santé. La vaccination est également ouverte aux enfants de 2 à 17 ans et plus. **La campagne de vaccination a débuté le 13 octobre 2026 en France hexagonale.**

COVID-19

La vaccination est recommandée chaque année, à l'automne, pour les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes à risque de forme grave de Covid-19. **La campagne de vaccination a débuté le 13 octobre 2026 en France hexagonale.**

Gastro-entérites aiguës

La vaccination des nourrissons contre le rotavirus est recommandée pour tous les nourrissons dès l'âge de 6 semaines.

Deux vaccins sont disponibles en France, il s'agit de vaccins « à boire » (oraux) : aucune injection n'est nécessaire.



Bronchiolite chez l'enfant de moins de 1 an



Figure 1. Taux et nombre de diagnostics de bronchiolite parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)





Figure 2. Taux et nombre de diagnostics de bronchiolite parmi le total des consultations depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



* Les données de la semaine 43 ne sont pas disponibles.

Syndromes grippaux



Figure 3. Taux et nombre de diagnostics de syndrome grippal parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)





Figure 4. Taux et nombre de diagnostics de syndrome grippal parmi le total des consultations depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



* Les données de la semaine 43 ne sont pas disponibles.

COVID-19



Figure 5. Part de la COVID-19 / suspicions de COVID-19 parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)






Figure 6. Part de la COVID-19 / suspicions de COVID-19 parmi le total des consultations depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



* Les données de la semaine 43 ne sont pas disponibles.

Figure 7. Evolution de la circulation du SARS-Cov-2 dans les eaux usées en Grand Est depuis la semaine 2026-06. (Source SUM'EAU).



* Le dispositif de surveillance microbiologique des eaux usées (SUM'EAU) permet de suivre la circulation du SARS-CoV-2 dans les eaux usées au niveau de la région Grand Est à partir d'un suivi réalisé auprès de 5 stations de traitement des eaux usées selon une fréquence hebdomadaire. Les 5 stations suivies sont localisées à proximité des agglomérations de Reims, Nancy, Metz, Strasbourg et Mulhouse. L'indicateur eaux usées correspond au ratio de concentration virale de SARS-CoV-2 sur la concentration en azote ammoniacal.

Gastro-entérites aiguës



Figure 8. Taux et nombre de diagnostics de gastro-entérites aiguës parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 30-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)






Figure 9. Taux et nombre de diagnostics de gastro-entérites aiguës parmi le total des consultations depuis la semaine 30-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



* Les données de la semaine 43 ne sont pas disponibles.

Mortalité toutes causes

Figure 10. Mortalité toutes causes, toutes classes d'âge confondues, jusqu'à la semaine 42-2026, Grand Est (Source : Insee, au 28/10/2026)



Remerciements à nos partenaires

- Services d'urgences du réseau OSCOUR® ;
- Associations SOS Médecins de Meurthe-et-Moselle, Mulhouse, Reims, Strasbourg et Troyes ;
- Réseau Sentinelles ;
- Systèmes de surveillance spécifiques :
 - Cas graves de grippe hospitalisés en réanimation ;
 - Épisodes de cas groupés d'infections respiratoires aiguës en établissements hébergeant des personnes âgées ;
 - Analyses virologiques réalisées aux CHU de Nancy, Reims et Strasbourg ;
- Autres partenaires régionaux spécifiques :
 - Observatoire des urgences Est-RESCUE ;
 - Agence régionale de santé Grand Est.

Comité de rédaction

Virginie Bier, Morgane Colle, Caroline Fiet, Nadège Marguerite, Lidiana Munerol, Sophie Raguét, Marion Rollin, Justine Trompette.

Pour nous citer : Bulletin épidémiologique. Édition Grand Est. 29 octobre. Saint-Maurice : Santé publique France, 10 pages, 2026.

Directeur de publication : Etienne POT, directeur général

Dépôt légal : 30 octobre 2026

Contact : grandest@santepubliquefrance.fr

Contact presse : presse@santepubliquefrance.fr