

Marqueurs biologiques de l'état nutritionnel – Adultes 18-74 ans

Tableaux de distribution – Etude nationale nutrition santé (ENNS)

Tableau 1.7.1. : Triglycéridémie à jeun (en millimoles par litre) chez les adultes de 18 à 74 ans : pourcentages cumulés, moyenne, médiane, 2,5^e et 97,5^e percentiles, minimum et maximum (Etude nationale nutrition santé, ENNS, 2006-2007)

	Age (années)			Tous
	18-29 ans	30-54 ans	55-74 ans	
Hommes				
< 1,0 mmol/l	56,7	38,1	30,7	40,0
< 1,7 mmol/l	89,9	75,9	75,4	78,8
< 2,3 mmol/l	95,7	88,4	87,5	89,8
< 4,6 mmol/l	100,0	99,1	97,2	98,8
Moyenne	1,1	1,5	1,5	1,4
Médiane	1,0	1,2	1,2	1,1
2,5 ^e percentile	0,4	0,5	0,5	0,5
97,5 ^e percentile	3,0	3,8	5,6	3,8
Minimum	0,4	0,4	0,4	0,4
Maximum	3,8	18,5	10,2	18,5
Femmes				
< 1,0 mmol/l	66,5	54,4	40,7	53,0
< 1,7 mmol/l	91,0	85,7	81,5	85,7
< 2,3 mmol/l	98,5	95,1	93,7	95,5
< 4,6 mmol/l	100,0	99,5	99,5	99,7
Moyenne	1,0	1,1	1,2	1,1
Médiane	0,8	1,0	1,1	1,0
2,5 ^e percentile	0,5	0,4	0,5	0,4
97,5 ^e percentile	2,0	2,6	2,5	2,6
Minimum	0,4	0,3	0,3	0,3
Maximum	2,7	6,1	5,0	6,1

Conditions de mesure : test de coloration enzymatique ; sujets à jeun depuis au moins 12 heures.
Résultats pondérés et redressés.

Note : les seuils de référence sont ceux des recommandations européennes (1) :

Sans risque :	Triglycéridémie < 1,7 mmol/l
Suspect :	1,7 mmol/l ≤ Triglycéridémie < 2,3 mmol/l
Nécessite de l'attention et une intervention :	2,3 mmol/l ≤ Triglycéridémie < 4,6 mmol/l
Nécessite un traitement :	Triglycéridémie ≥ 4,6 mmol/l

(1) Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps). Recommandations pour la prise en charge thérapeutique du patient dyslipidémique. Paris, 2005. Consultable sur <http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Recommandations-de-bonne-pratique/Prise-en-charge-du-patient-dyslipidémique-recommandations-de-bonne-pratiques>