

Marqueurs biologiques de l'état nutritionnel – Adultes 18-74 ans

Tableaux de distribution – Etude nationale nutrition santé (ENNS)

Tableau 1.7.6. : Hémoglobine glyquée (en %) chez les adultes de 18 à 74 ans : pourcentages cumulés, moyenne, médiane, 2,5^e et 97,5^e percentiles, minimum et maximum (Etude nationale nutrition santé, ENNS, 2006-2007)

	Age (années)			Tous
	18-29 ans	30-54 ans	55-74 ans	
Hommes				
< 4,0 %	-	0,3	0,2	0,2
< 4,5 %	13,8	2,1	0,4	4,0
< 5,0 %	55,8	29,3	15,7	31,1
< 5,5 %	96,8	79,2	62,0	78,1
< 6,0 %	100,0	95,6	82,6	93,0
< 6,5 %	-	96,6	93,4	96,5
< 7,0 %	-	96,6	96,3	97,3
Moyenne	4,8	5,2	5,5	5,2
Médiane	4,9	5,2	5,3	5,1
2,5 ^e percentile	4,2	4,5	4,8	4,3
97,5 ^e percentile	5,5	7,0	7,7	7,0
Minimum	4,0	3,9	3,5	3,5
Maximum	5,6	9,5	9,6	9,6
Femmes				
< 4,0 %	0,2	0,5	-	0,3
< 4,5 %	12,8	6,6	0,5	6,1
< 5,0 %	74,5	43,5	14,2	41,5
< 5,5 %	97,1	88,5	63,2	82,9
< 6,0 %	100,0	98,1	92,1	96,7
< 6,5 %	-	98,8	96,5	98,3
< 7,0 %	-	98,8	98,6	98,9
Moyenne	4,8	5,0	5,4	5,1
Médiane	4,8	5,0	5,3	5,0
2,5 ^e percentile	4,3	4,3	4,6	4,3
97,5 ^e percentile	5,5	5,8	6,6	6,1
Minimum	3,7	3,6	4,4	3,6
Maximum	5,8	12,5	9,5	12,5

Conditions de mesure : Chromatographie liquide haute pression (HPLC).
Résultats pondérés et redressés.

Note : les seuils retenus pour l'hémoglobine glyquée sont ceux de la Haute Autorité de Santé (HAS), soit une glycémie à jeun ≥ 7 mmol/l (1).

(1) Haute Autorité de Santé (HAS). Recommandation professionnelle. Traitement médicamenteux du diabète de type 2 - Actualisation. Paris, 2006. Consultable sur : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/synthese_diabete-2006.pdf