

Marqueurs biologiques de l'état nutritionnel – Adultes 18-74 ans

Tableaux de distribution – Etude nationale nutrition santé (ENNS)

Tableau 1.8.11. : Hémoglobininémie (en grammes par décilitre) chez les adultes de 18 à 74 ans : pourcentages cumulés, moyenne, médiane, 2,5^e et 97,5^e percentiles, minimum et maximum (Etude nationale nutrition santé, ENNS, 2006-2007)

	Age (années)			Tous
	18-29 ans	30-54 ans	55-74 ans	
Hommes				
< 10 g/dl	-	-	0,9	0,2
< 11 g/dl	-	-	1,2	0,3
< 12 g/dl	-	-	3,0	0,8
< 13 g/dl	-	1,4	4,2	1,9
< 14 g/dl	9,0	7,6	13,2	9,5
< 15 g/dl	33,8	35,8	42,2	37,1
< 16 g/dl	64,1	77,3	74,1	73,5
Moyenne	15,4	15,3	15,1	15,3
Médiane	15,5	15,2	15,2	15,3
2,5 ^e percentile	13,0	13,5	11,8	13,0
97,5 ^e percentile	17,1	17,1	17,8	17,2
Minimum	13,0	12,2	8,1	8,1
Maximum	18,3	17,7	24,3	24,3
Femmes				
< 10 g/dl	0,9	1,0	0,1	0,7
< 11 g/dl	1,1	1,6	0,2	1,1
< 12 g/dl	7,2	4,4	2,8	4,5
< 13 g/dl	23,9	20,7	15,3	19,8
< 14 g/dl	72,0	62,2	54,7	62,1
< 15 g/dl	92,5	93,2	88,9	91,8
< 16 g/dl	96,3	98,5	97,0	97,6
Moyenne	13,5	13,6	13,8	13,7
Médiane	13,5	13,7	13,8	13,7
2,5 ^e percentile	11,2	11,3	11,7	11,3
97,5 ^e percentile	16,4	15,7	16,2	15,9
Minimum	8,9	6,5	9,2	6,5
Maximum	17,2	17,6	18,0	18,0

Conditions de mesure : mesure par impédance (mesure d'impulsion), technique sans cyanure.

Résultats pondérés et redressés.

Note : les seuils de référence retenus pour les déficiences en hémoglobine sont ceux de l'Organisation mondiale de la santé (1) :

Déficience (hommes) : Hémoglobininémie < 13 g/dl

ficience (femmes) : Hémoglobininémie < 12 g/dl

(1) World Health Organisation (WHO). Nutritional anaemias. Report of a WHO scientific group. World Health Organ Tech Rep Ser. 1968;405:5-37