

Surveillance des cas cliniquement évocateurs

Depuis le début de l'épidémie de gastro-entérite détectée en début d'année 2012, une augmentation du nombre de consultations chez les médecins de ville a pu être observée jusqu'au pic maximum de la semaine 04-2012 où 2300 cas ont été estimés* (Fig.1).


Depuis, le nombre hebdomadaire de ces consultations décroît, mais reste supérieur

aux valeurs maximales attendues pour la saison. En effet, lors de la dernière semaine de février, le nombre de cas estimés était encore près du double de la valeur maximale attendue.

*Le nombre de cas cliniques est une estimation pour l'ensemble de la population guadeloupéenne du nombre de personnes ayant consulté un médecin généraliste pour un syndrome clinique évocateur de gastro-entérites. Cette estimation est réalisée à partir des données recueillies par le réseau des médecins sentinelles.

| Figure 1 |

Nombre hebdomadaire des cas cliniquement évocateurs de gastro-entérite, Guadeloupe, octobre 2009 à février 2012




Surveillance des passages aux urgences

Suite à une augmentation du nombre de passages aux urgences du CHU et du CHBT lors des cinq premières semaines de l'année, ce nombre semble s'être stabilisé depuis trois semaines autour de 30 consultations par semaine (Fig. 2).

Le nombre des hospitalisations consécutives à ces passages reste faible tout au long de la période épidémique.

| Figure 2 |

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences du CHU et CHBT et des hospitalisations consécutives, Guadeloupe, janvier et février 2012



Analyse de la situation

L'épidémie de gastro-entérites détectée en Guadeloupe début janvier est entrée dans sa phase de décroissance depuis le pic de consultations observé en médecine de ville fin janvier. Néanmoins, cette épidémie n'est pas encore terminée.

Pour limiter la transmission des virus à l'origine de ces épidémies, il est primordial d'appliquer les règles d'hygiène de base, notamment le lavage régulier des mains avec du savon, en particulier lors des soins aux personnes fragiles et avant les repas.

De plus, il est rappelé aux parents que si leurs enfants (en particulier les plus jeunes) présentent des symptômes de gastro-entérite (diarrhées, vomissements), ils doivent consulter leur médecin traitant afin d'éviter tout phénomène de déshydratation qui peut être sévère chez les nourrissons.

Remerciement à la Cellule de Veille, d'Alerte et de Gestion Sanitaire de l'ARS, réseau de médecins généralistes sentinelles, services hospitaliers (Urgences, laboratoires, services d'hospitalisation), LABM ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance épidémiologique.