

Surveillance des cas cliniquement évocateurs

Au cours de la dernière semaine de décembre et de la 1^{ère} de janvier, le nombre de consultations des médecins généralistes pour gastro-entérite a dépassé les valeurs maximales attendues pour la saison.


Cette augmentation s'est poursuivie de façon rapide, atteignant 2300 cas estimés* (Fig.1) au cours de la dernière semaine de janvier qui semble marquer le pic de l'épidémie.

En effet, on observe une décroissance du nombre de cas depuis le début du mois de février. Néanmoins, le nombre hebdomadaire de consultations reste très supérieur aux valeurs maximales attendues.

*Le nombre de cas cliniques est une estimation pour l'ensemble de la population guadeloupéenne du nombre de personnes ayant consulté un médecin généraliste pour un syndrome clinique évocateur de gastro-entérites. Cette estimation est réalisée à partir des données recueillies par le réseau des médecins sentinelles.

| Figure 1 |

Nombre hebdomadaire des cas cliniquement évocateurs de gastro-entérite, Guadeloupe, octobre 2009 à janvier 2012



Surveillance des passages aux urgences, virus identifiés

Cette évolution a également été observée par les services d'urgence du CHU et du CH de Basse-Terre.

Le nombre hebdomadaire de passages aux urgences recensés pour gastro-entérite est en effet passé de 12 à 38 au cours des

5 premières semaines de l'année. Il diminue pour la première fois au cours de la 2^{ème} semaine de février.

Par ailleurs, les virus suivants ont été identifiés par le CHU au mois de janvier : rotavirus, adénovirus et norovirus.

Analyse de la situation

L'épidémie de gastro-entérites détectée en Guadeloupe début janvier se poursuit. Il semble que le pic épidémique ait été atteint mais le nombre de cas est toujours très élevé.

Pour limiter la transmission des virus à l'origine de ces épidémies, il est primordial d'appliquer les règles d'hygiène de base, notamment le lavage régulier des mains avec du savon, en particulier lors des soins aux personnes fragiles et avant les repas.

De plus, il est rappelé aux parents que si leurs enfants (en particulier les plus jeunes) présentent des symptômes de gastro-entérite (diarrhées, vomissements), ils doivent consulter leur médecin traitant afin d'éviter tout phénomène de déshydratation qui peut être sévère chez les nourrissons.

Remerciement à la Cellule de Veille, d'Alerte et de Gestion Sanitaire de l'ARS, réseau de médecins généralistes sentinelles, services hospitaliers (Urgences, laboratoires, services d'hospitalisation), LABM ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance épidémiologique.